



หากถูกกัดแล้ว ควรปฏิบัติตนอย่างไร ?



1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด
ฟอกสบู่เบาๆ ให้ถึงกันแผล
และล้างออกให้หมด
(ถ้าจำเป็นเวลานาน 15 นาที) การล้างแผล
จะช่วยลดปริมาณเชื้อได้ถึง **80%**



2. ทายาเบตาดีน
และรีบมาพบแพทย์
โดยเร็วที่สุด เพื่อรับการรักษ
และฉีดวัคซีนป้องกันโรค



3. กักสุนัขเพื่อดูอาการ **10 วัน**
ถ้าตายให้นำซากมาตรวจ แต่ถ้าไม่ตาย
แสดงว่าสุนัขตัวนั้นไม่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า



4. ฉีดวัคซีนต่อให้ครบตามนัด
และควรเข้ารับวัคซีน
ให้ตรงตามที่แพทย์นัด



ป้องกันสุนัขกัด ได้อย่างไร ?



หลักคทา **5 ย.** ได้แก่
“อย่าเหย อย่าเหยียบ อย่าแยก
อย่าหยิบ อย่ายุ่ง”



1.

อย่าเหย
ให้สุนัขโมโห



2.

อย่าเหยียบ สุนัข
หรือทำให้ตกใจ



3.

อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกัน
ด้วยมือเปล่า



4.

อย่าหยิบ ชามอาหาร
หรือของที่สุนัขหวง



5.

อย่ายุ่ง กับสุนัขจรจัด
หรือสุนัขที่ไม่ทราบประวัติวัคซีน



กรมควบคุมโรค



@line1422

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566



กรมควบคุมโรค
DEPARTMENT OF DISEASE CONTROL



โรค พิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดได้ใน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว โค กระบือ สุกร รวมถึงคน เมื่อได้รับเชื้อ หากปล่อยไว้จนเกิดอาการ จะเสียชีวิต ทุกราย แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน



ปัจจุบันยังไม่มียารักษา
โรคพิษสุนัขบ้า



สัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามีอาการอย่างไร?



สัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า อาจแสดงอาการได้ 3 ระยะ ได้แก่

1. ระยะเริ่มแรก



มีอาการซึมและนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม กินข้าว กินน้ำลดลง

2. ระยะตื่นเต้น

กระวนกระวาย ตื่นเต้น ไม่อยู่นิ่ง กัดทุกสิ่งไม่เลือก วังโล่กัดคนหรือสัตว์



3. ระยะอัมพาต

ค้างคอก ลิ้นห้อยสีแดงคล้ำ น้ำลายไหล ทรงตัวไม่ได้ เป็นอัมพาตและตาย ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะติดจากสัตว์ที่มีอาการเหล่านี้



ติดเชื่อได้ทางไหนบ้าง ?

สามารถติดเชื่อโรคพิษสุนัขบ้าได้ 2 ทาง คือ

1. ถูกกัดหรือข่วน ทำให้น้ำลายของสัตว์เข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผล แม้แผลเพียงเล็กน้อยก็สามารถติดเชื่อได้



2. ถูกเลียที่บาดแผล รอยถลอกหรือรอยขีดข่วน รวมทั้งริมฝีปากหรือนัยน์ตา



อาการโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอย่างไร ?

(ผู้ป่วยจะแสดงอาการ หลังได้รับเชื้อประมาณ 3 สัปดาห์ - 6 เดือน หรืออาจนานถึง 1 ปี)

- **อาการเริ่มแรก:** ไข้ต่ำ เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย และคันรุนแรงบริเวณแผลที่ถูกกัด
- **อาการทางประสาท:** กระสับกระส่าย คลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง มีอาการหนาวสั่น กลืนลำบากโดยเฉพาะของเหลว
- **อาการระยะสุดท้าย:** กล้ามเนื้อเกร็ง - กระตุก แขนขาอ่อนแรง หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก หมดสติและเสียชีวิตในที่สุด

